



熱計表は診察時、院長へお渡してください。
11/14(土)は院長学会参加の為、休診です。

症状経過表

おなまえ: _____ 様

いけざわこどもクリニック 096-242-6633

時間 内服	月 日			日 日			日 日			日 日			日 日		
	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜
40															
39															
38															
37															
36															

熱さましの坐薬、頓服を使用した時は
をつけてください

木曜と土曜は、午後ワクチンだけです
午前中に来院してください
麻疹 MR MR 未接種
熱性痙攣 あり なし
(37.5 以上でいれる。続けば8H後に2回目を)
突発性発疹 すみ まだ
幼・保 年少・年中・年長・未満児
小・中学校 年

気になったこと、聞きたいこと

お薬希望; 粉・シロップ・錠剤

熱さまし; あり(個くらい)・なし
希望; 坐薬・粉・錠剤

熱さましは38 ~ 38.5 以上で
5~6H間隔で再度使用可(ひどい時は4Hでも可)
ぐずる時・痛い時に使用、元気なら使わない

症状がひどく続く時には
お薬が残っていても早めに来院を!
改定2009.10.22

咳															
鼻															
機嫌															
水分															
尿															
下痢															
嘔吐															
腹痛															
頭痛															
のど															

ひどい++, ある+, すこしだけ+~, ない- 等症状を書き込んでください。



熱計表は診察時、院長へお渡してください。
11/14(土)は院長学会参加の為、休診です。

症状経過表

おなまえ: _____ 様

いけざわこどもクリニック 096-242-6633

時間 内服	月 日			日 日			日 日			日 日			日 日		
	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜
40															
39															
38															
37															
36															

熱さましの坐薬、頓服を使用した時は
をつけてください

木曜と土曜は、午後ワクチンだけです
午前中に来院してください
麻疹 MR MR 未接種
熱性痙攣 あり なし
(37.5 以上でいれる。続けば8H後に2回目を)
突発性発疹 すみ まだ
幼・保 年少・年中・年長・未満児
小・中学校 年

気になったこと、聞きたいこと

お薬希望; 粉・シロップ・錠剤

熱さまし; あり(個くらい)・なし
希望; 坐薬・粉・錠剤

熱さましは38 ~ 38.5 以上で
5~6H間隔で再度使用可(ひどい時は4Hでも可)
ぐずる時・痛い時に使用、元気なら使わない

症状がひどく続く時には
お薬が残っていても早めに来院を!
改定2009.10.22

咳															
鼻															
機嫌															
水分															
尿															
下痢															
嘔吐															
腹痛															
頭痛															
のど															

ひどい++, ある+, すこしだけ+~, ない- 等症状を書き込んでください。